

REFERENCES AZOTE 2018 TOURNESOL



La dose d'azote prévisionnelle est déterminée sur la base d'une dose pivot.

Deux méthodes sont retenues :

1°) Détermination de la dose d'azote prévisionnelle totale en fonction du type de sol et/ou de l'objectif de rendement (méthode n°1)

2°) Méthode dite « Héliotest » (méthode n°2).

Méthode n°1

Dose d'azote prévisionnelle totale (reporter la valeur colonne J)

Type de sol	Objectif de rendement	Dose d'azote (unité / ha)		
		Reliquat azoté au semis faible	Reliquat azoté au semis moyen	Reliquat azoté au semis élevé
Alluvions limoneuses à argilo-limoneuses Alluvions sableuses et caillouteuses Argiles (terreforts, palus) Argilo calcaire profond Bouillonne profonde Sables blancs Sables limoneux Sables noirs Sols de marais Touyas, terres noires	≥ à 35 q/ha	90	60	30
Argilo calcaire moyen Bouillonne moyenne	≥ à 30 q/ha et < à 35 q/ha	75	45	15
Argilo calcaire superficiel Bouillonne superficielle	< à 30 q/ha	60	30	0

Pour les tournesols irrigués, les préconisations sont calculées uniquement par rapport à l'objectif de rendement, pas en fonction du type de sol.

Pour les tournesols non irrigués, les préconisations tiennent compte de l'objectif de rendement. Dans le cas d'un sol limitant, les préconisations tiendront compte uniquement du type de sol.

Méthode n°2

1^{er} étape

L'agriculteur applique 60 à 80 unités d'azote sur une bande de la parcelle.

2^{ème} étape

L'agriculteur observe si une éventuelle différence apparaît entre la bande témoin fertilisée au semis et le reste de la parcelle entre le stade 6 et 14 feuilles (différence de couleur, de hauteur ou de volume). Le stade auquel apparaît la différence permet d'estimer l'état d'alimentation azotée de la parcelle et les fournitures en azote du sol sur le cycle de la culture

Dose d'azote à apporter (reporter la valeur colonne J)

Dose d'azote entre le stade 6 et 14 feuilles (kg / ha)					
Stade d'apparition de la différence avec le témoin	Objectif de rendement				
	20 q / ha	25 q / ha	30 q / ha	35 q / ha	40 q / ha
7 à 8 feuilles	0	30	40	70	100
9 à 10 feuilles	0	0	30	50	80
11 à 12 feuilles	0	0	0	30	60
13 à 14 feuilles	0	0	0	30	40
TERRE INOVIA					

Nota : Aucune fertilisation minérale azotée est nécessaire en absence de différence avec le témoin entre le stade 6 et 14 feuilles.

Tableau n°7

Apport par l'eau d'irrigation (Nirr)

(Dose d'irrigation en mm) X Teneur en nitrates de l'eau d'irrigation en mg / l) / 443								443
Dose irrigation = quantité d'eau d'irrigation prévue jusqu'à 3 semaines après floraison								
Teneur en nitrates de l'eau d'irrigation	25		mg / l ou analyses pour les eaux superficielles					
	40		mg / l ou analyses pour les eaux souterraines					
Dose irrigation (mm)	100	120	140	160	180	200	220	240
N apporté 25 mg/l (kg/ha)	6	7	8	9	10	11	12	14
N apporté 40 mg/l (kg/ha)	9	11	13	14	16	18	20	22

Tableau n°8 Valeurs fertilisantes des engrais organiques

Type d'effluents	Valeurs			Type d'effluents	Valeurs		
FUMIERS (T)	N	P	K	LISIERS (m3)	N	P	K
Fumiers de bovins mous de logettes	5,1	2,3	6,2	Lisiers de bovins (pur en système couvert)	4	2	5
Fumiers de bovins de litière accumulée	5,8	2,3	9,6	Lisiers de bovins (dilué en système non couvert)	1,6	0,8	2,4
Composts de fumier de bovins	8	5	14	Lisiers de veaux	2	1	2
Fumiers de caprins	6,1	5,2	7	Purins de bovins	0,4	0,2	1,5
Fumiers d'ovins	6,7	4	12	Lisiers de canards	2,5	1,2	1
Fientes sèches de poules pondeuses	30	40	28	Lisiers de canards (fosse couverte)	4,4	1,7	2,5
Fumiers stockés de dindes	21	25	18	Lisiers de porcs à l'engraissement	7,9	7,8	5
Fumiers stockés de pintades	24	23	18	Lisiers de porcs naisseur-engraisseur	4	3,5	2,5
Fumiers autres volailles de chair industrielles	22	22	15	AUTRES EFFLUENTS (m3)	N	P	K
Fumiers stockés de poulet label	12	10	9	Boues urbaines compostées	8	8	3
Fumiers de canards prêt à gaver	5	4,5	2,2	Boues urbaines pâteuses	10	8	1
Fumiers de porcs	7,2	7	10,2	Boues urbaines liquides	3	2	0,9
Fumiers de lapins	7	7	12	Effluents viticoles	0,1	0,44	0,4
Fumiers frais de chevaux	8,2	3,2	9	Effluents prunicoles	0,02	0,004	0,1

**Tableau n°9**

Coefficients d'équivalence azote (Keq)

Type d'effluents	Keq		Type d'effluents	Keq	
	Apport automne	Apport printemps		Apport automne	Apport printemps
FUMIERS (T)			LISIERS (m³)		
Fumiers de bovins mous de logettes	0,2	0,3	Lisiers de bovins (pur en système couvert)	0,2	0,5
Fumiers de bovins de litière accumulée	0,2	0,3	Lisiers de bovins (dilué en système non couvert)	0,2	0,5
Composts de fumier de bovins	0,15	0,2	Lisiers de veaux	0,2	0,5
Fumiers de caprins	0,2	0,3	Purins de bovins	0,2	0,5
Fumiers d'ovins	0,2	0,3	Lisiers de canards	0,3	0,6
Fientes sèches de poules pondeuses	0,3	0,6	Lisiers de canards (fosse couverte)	0,3	0,6
Fumiers stockés de dindes	0,3	0,5	Lisiers de porcs à l'engraissement	0,3	0,6
Fumiers stockés de pintades	0,3	0,5	Lisiers de porcs naisseur-engraisseur	0,3	0,6
Fumiers autres volailles de chair industrielles	0,3	0,5	AUTRES EFFLUENTS (m³)		
Fumiers stockés de poulet label	0,3	0,5	Boues urbaines compostées	0,1	0,1
Fumiers de canards prêt à gaver	0,3	0,5	Boues urbaines pâteuses	0,25	0,3
Fumiers de porcs	0,2	0,4	Boues urbaines liquides	0,2	0,5
Fumiers de lapins	0,2	0,3	Effluents viticoles	0,2	0,5
Fumiers frais de chevaux	0,2	0,3	Effluents prunicoles	0,2	0,5