



## REFERENCES AZOTE 2017 CEREALES A PAILLE

### **Tableau n°1**

Besoin en azote de la culture (Pf)

Type de céréale	Besoin N (kg/q)
Triticale	2,6
Seigle	2,3
Orge	2,5
Avoine	2,2
Blé tendre d'hiver *	3
Blé dur	3,7
Blé tendre améliorant	3,5

\* Pour le blé tendre d'hiver, possibilité de se référer aux besoins par variétés 2015 (cf. Feuille Arvalis)

### **Tableau n°2**

Azote minéral restant à la récolte (Rf)

Type de sol	Rf (kg N / ha)
<b>Alluvions limoneuses à argilo-limoneuses</b>	30
<b>Alluvions sableuses et caillouteuses</b>	30
<b>Argiles (terreforts, palus)</b>	40
<b>Argilo calcaire moyen à superficiel</b>	30
<b>Argilo calcaire profond</b>	40
<b>Boulbène moyenne à superficielle</b>	15
<b>Boulbène profonde</b>	20
<b>Sables blancs</b>	10
<b>Sables limoneux</b>	15
<b>Sables noirs</b>	10
<b>Sols de marais</b>	30
<b>Touyas, terres noires</b>	30

## Reliquat azoté en sortie d'hiver (Ri)

### **Cas d'une cultures intermédiaires précédent la culture**

(Tableau 3a)

Type de sol	Ri (kg N / ha)
Alluvions limoneuses à argilo-limoneuses	30
Alluvions sableuses et caillouteuses	30
Argiles (terreforts, palus)	40
Argilo calcaire moyen à superficiel	30
Argilo calcaire profond	40
Boulbène moyenne à superficielle	15
Boulbène profonde	20
Sables blancs	10
Sables limoneux	15
Sables noirs	10
Sols de marais	30
Touyas, terres noires	30

### **Cas d'un précédent prairie, dérobée ou jachère**

(Tableau 3b)

		Ri en kg N/ha				
		Dérobée ou Prairie de 1 à 2 ans	Prairie de 3 à 6 ans	Prairie de plus de 6 ans	Jachère annuelle	Jachère pluriannuelle
Graminées pures	Pâturage intégrale	71,5	121,5	146,5	72	82
	Fauche + pâturage	64	99	116,5	72	82
	Fauche intégrale	56,5	76,5	86,5	72	82
Association graminées-légumineuses	/	71,5	71,5	146,5	82	82

### **Autres cas (maïs, céréales à pailles, oléagineux, protéagineux)**

**1<sup>ère</sup> étape** : détermination de la quantité d'azote efficace apporté au précédent – valeur en bleu (définition selon le [Tableau 3c](#))

**2<sup>ème</sup> étape** : détermination de l'Azote Potentiellement Lessivable – valeur en rouge (définition selon le [Tableau 3d](#) en fonction du précédent cultural, du rendement et du niveau de fertilisation N du précédent)

**3<sup>ème</sup> étape** : détermination du reliquat N au 1<sup>er</sup> mai (reliquat N après hiver) en réutilisant l'Azote Potentiellement Lessivable ([Tableau 3e](#))

*Tableau 3c*

**Fertilisation du précédent**

<b>Apport à prendre en compte</b>	<b>Références</b>	<b>Calcul</b>	<b>Exemple</b>
A - Azote minéral total sur la culture précédente	<i>Fiche parcellaire n-1</i>	/	200 U <sub>N</sub> /ha
B - Quantité d'azote organique apporté au précédent	<i>Fiche parcellaire n-1</i>	/	20 m3/ha (lisier canard)
C - Teneur de l'effluent	<i>Tableau n°9</i>	/	2,5
D - Coefficient d'effet direct	<i>Tableau n°10_maïs Tableau n°10_céréales Tableau n°10_prairie Tableau n°10_colza</i>	/	0,58 (apport de printemps)
E - Quantité efficace d'azote organique apporté au précédent	<i>Calcul</i>	B x C x D	29 U <sub>N</sub> /ha
F - Retournement d'une prairie avant le précédent	<i>Tableau n°6</i>	/	0 (précédent maïs grain)
G - Retournement d'une prairie deux ans avant le précédent	<i>Tableau n°6</i>	/	25 U <sub>N</sub> /ha (prairie de 4-5 ans graminées-légumineuses)
H - Cipan avant le précédent	<i>Tableau n°7</i>	/	0 U <sub>N</sub> /ha
<b>Azote apporté au précédent</b>	<b><i>Calcul</i></b>	<b>A + E + F + G</b>	<b>254 U<sub>N</sub>/ha</b>

### Tableaux 3d

VALEUR DU A en 2017    155

PRECEDENTS Cultures de printemps		Maïs grain							Sorgho grain			Tournesol				Maïs ensilage			Sorgho ensilage		
		Rendements (q/ha)							Rendements (q/ha)			Rendements (q/ha)				Rendements (t MS/ha)			Rendements (t MS/ha)		
		70	90	100	110	120	130	150	50	70	90	20	25	30	35	13	16	18	11	14	16
		Fertilisation N du précédent (U/ha)							Fertilisation N du précédent (U/ha)			Fertilisation N du précédent (U/ha)				Fertilisation N du précédent (U/ha)			Fertilisation N du précédent (U/ha)		
APL (Azote Potentiellement Lessivable)	0	5	50	65	85	110	120	160	0	40	95	0	0	0	0	25	40	95	0	25	55
	20	50	90	105	125	150	160	200	25	85	140	0	0	15	35	70	85	140	40	70	95
	40	90	130	145	165	190	200	240	70	125	180	25	45	65	85	110	125	180	80	110	135
	60	130	170	185	205	230	240	280	110	165	220	75	95	115	135	150	165	220	125	150	180
	80	175	210	225	245	270	280	320	150	210	265	125	145	165	185	195	210	265	165	195	220
	100	215	250	265	285	310	320	360	195	250	305	175	195	215	235	235	250	305	205	235	260

PRECEDENTS Cultures d'hiver		Blé tendre d'hiver			Triticale			Orge d'hiver			Avoine d'hiver			Colza d'hiver			Protéagineux	
		Rendements (q/ha)			Rendements (q/ha)			Rendements (q/ha)			Rendements (q/ha)			Rendements (q/ha)				
		50	60	70	50	60	70	40	50	60	40	50	60	25	30	35		
		Fertilisation N du précédent (U/ha)			Fertilisation N du précédent (U/ha)			Fertilisation N du précédent (U/ha)			Fertilisation N du précédent (U/ha)			Fertilisation N du précédent (U/ha)				
APL (Azote Potentiellement Lessivable)	0	0	25	55	0	0	25	0	0	0	85	145	205	0	25	55	APL (Azote Potentiellement Lessivable)	Soja
	20	70	100	130	50	75	100	20	45	70	160	220	280	45	75	105		100
	40	145	175	205	125	150	175	95	120	145	235	295	355	95	125	155		Pois
	60	215	245	275	195	225	250	165	190	215	305	365	425	145	175	205		110
	80	290	320	350	270	295	325	240	265	290	380	440	500	195	225	255		Lupin - Féverole
	100	365	395	425	345	370	395	315	340	365	455	515	575	245	275	305	100	

**Remarque :** Dans le cas d'un apport d'engrais organique avant l'ouverture du bilan, l'APL sera augmentée de la quantité d'azote efficace apportée ( quantité/ha x teneur x Keq apport d'automne).

Tableau 3e

Type de sol	APL en kg N/ha	Cumul de pluie entre le 1er octobre et le 1er mars (en mm)								
		150	200	250	300	350	400	450	500	600
Alluvions limoneuses à argilo-limoneuses	0	40	39	38	36	34	33	32	32	32
	20	54	52	49	43	38	34	33	32	32
	40	68	65	59	50	42	36	33	32	32
	60	83	79	70	57	45	38	34	33	32
	80	97	92	81	65	49	39	35	33	32
	100	111	105	91	72	53	41	35	33	32
Alluvions sableuses et caillouteuses	0	24	24	24	23	23	23	23	23	23
	20	37	36	33	29	26	24	23	23	23
	40	51	48	42	34	28	25	24	23	23
	60	65	60	51	40	31	26	24	23	23
	80	78	72	60	45	33	27	24	24	23
	100	92	84	70	51	36	28	25	24	23
Argiles (terreforts, palus)	0	22	22	22	22	22	22	21	21	21
	20	37	36	34	32	28	25	23	22	22
	40	52	50	47	41	35	29	25	23	22
	60	67	64	59	51	41	33	27	24	22
	80	82	78	71	61	48	37	29	25	22
	100	97	92	84	70	54	41	31	26	22
Argilo calcaire moyen à superficiel	0	26	25	24	22	20	18	15	13	11
	20	43	42	40	36	31	26	20	16	12
	40	61	59	55	50	42	34	26	20	13
	60	78	75	71	63	53	42	31	23	14
	80	96	92	86	77	64	49	36	26	15
	100	113	109	102	90	75	57	41	29	16
Argilo calcaire profond	0	30	30	29	29	28	27	27	27	26
	20	45	44	42	40	37	33	30	28	27
	40	59	58	55	51	45	39	33	30	27
	60	74	72	68	62	53	44	37	32	27
	80	89	86	82	73	62	50	40	33	28
	100	104	101	95	84	70	55	43	35	28
Boulbène moyenne à superficielle	0	26	25	24	22	19	16	14	13	11
	20	44	42	39	35	29	23	18	15	12
	40	62	60	55	48	38	29	22	17	12
	60	80	77	70	61	48	35	25	19	13
	80	98	94	86	74	58	42	29	21	13
	100	116	111	101	87	68	48	33	23	14

Type de sol	APL en kg N/ha	Cumul de pluie entre le 1er octobre et le 1er mars (en mm)								
		150	200	250	300	350	400	450	500	600
Boulbène profonde	0	41	41	40	38	36	34	33	32	32
	20	56	55	52	47	41	36	34	33	32
	40	71	69	65	57	47	39	35	33	32
	60	86	84	78	66	52	42	36	34	32
	80	101	98	90	76	58	44	37	34	32
	100	116	112	103	85	64	47	38	34	32
Sable blancs	0	50	40	22	17	16	16	16	16	16
	20	64	49	24	17	16	16	16	16	16
	40	77	59	27	17	16	16	16	16	16
	60	91	68	29	17	16	16	16	16	16
	80	105	77	31	18	16	16	16	16	16
	100	118	87	34	18	16	16	16	16	16
Sables limoneux	0	51	47	38	29	25	23	23	23	23
	20	69	62	47	33	26	24	23	23	23
	40	86	77	57	36	27	24	23	23	23
	60	104	92	66	40	28	24	23	23	23
	80	122	107	76	44	29	25	23	23	23
	100	139	122	85	48	30	25	24	23	23
Sables noirs	0	53	45	31	25	24	24	24	24	24
	20	72	58	35	25	24	24	24	24	24
	40	90	71	39	26	24	24	24	24	24
	60	108	83	43	27	24	24	24	24	24
	80	126	96	47	28	24	24	24	24	24
	100	144	109	52	28	24	24	24	24	24
Sols de marais	0	19	18	18	18	17	15	14	13	13
	20	35	35	34	32	28	24	19	16	13
	40	52	52	50	46	40	32	24	18	14
	60	69	68	66	61	52	40	29	21	14
	80	86	85	81	75	64	48	33	23	15
	100	103	101	97	89	75	56	38	25	15
Touyas, terres noires	0	50	49	48	46	44	41	39	38	37
	20	64	63	61	57	51	45	41	39	38
	40	78	76	73	67	58	49	43	40	38
	60	92	89	85	77	65	54	45	41	38
	80	105	103	97	87	72	58	48	42	38
	100	119	116	109	97	80	62	50	43	38

## **Tableau n°3 bis**

Quantité d'azote absorbée par les céréales d'hiver (Pi)

Nombre de talles primaires	Pas de talle	1	2	3	4	5	> à 5 talles*
Pi (en kg N/ha)	10	15	20	25	30	35	40

\* + 5 kg N/ha par talle supplémentaire en cas de forte biomasse, la valeur est plafonnée à 50 kg N/ha

Cette valeur n'est à utiliser qu'en cas de mesure de reliquat azote sortie hiver.

## **Tableau n°4**

Minéralisation de l'humus du sol (Mh)

Type de sol	Mh céréale à paille (kg N / ha)
Alluvions limoneuses à argilo-limoneuses	35
Alluvions sableuses et caillouteuses	25
Argiles (terreforts, palus)	25
Argilo calcaire moyen à superficiel	20
Argilo calcaire profond	20
Boulbène moyenne à superficielle	35
Boulbène profonde	35
Sables blancs	20
Sables limoneux	40
Sables noirs	35
Sols de marais	25
Touyas, terres noires	30

## **Tableaux n°5**

Minéralisation nette de résidus de récolte (Mr)

Précédent	Minéralisation nette de résidus de récolte (kg N / ha)
Autres précédents	0
Céréales pailles restituées	-20
Colza, Pois, Lupin, Soja, Betterave, Pomme de terre	20
Carotte, Endive	10
Féverole	30
Luzerne en N-2 (retournement fin d'été/début automne)	20
Luzerne en N-1 (retournement fin d'été/début automne)	40

 **Tableau n°6**

Minéralisation nette retournement de prairie en précédent et ante-précédent (Mhp)

Période de destruction et rang de la prairie par rapport à la culture	Mode d'exploitation et type de prairie	Mhp (kg N / ha)				
		Age de la prairie				
		<18 mois	2-3 ans	4-5 ans	6-10 ans	>10 ans
<b>Destruction d'automne d'un précédent prairie</b>	Graminées seules / Pâturage	10	30	50	60	70
	Graminées seules / Fauche + pâturage	7	21	35	42	49
	Graminées seules / Fauche uniquement	4	12	20	24	28
	Graminées + légumineuses	10	30	50	60	70
<b>Destruction d'automne d'un ante-précédent prairie</b>	Tous types de prairie	0	0	0	0	0
<b>Destruction de printemps d'un précédent prairie</b>	Graminées seules / Pâturage	20	60	100	120	140
	Graminées seules / Fauche + pâturage	14	42	70	84	98
	Graminées seules / Fauche uniquement	8	24	40	48	56
	Graminées + légumineuses	20	60	100	120	140
<b>Destruction de printemps d'un ante-précédent prairie</b>	Graminées seules / Pâturage	0	0	25	35	40
	Graminées seules / Fauche + pâturage	0	0	17,5	24,5	28
	Graminées seules / Fauche uniquement	0	0	10	14	16
	Graminées + légumineuses	0	0	25	35	40

## **Tableau n°7**

Apport par l'eau d'irrigation (Nirr)

<b>(Dose d'irrigation en mm) X Teneur en nitrates de l'eau d'irrigation en mg / l ) / 443</b>								<b>443</b>
<b>Dose irrigation = quantité d'eau d'irrigation prévue jusqu'à 3 semaines après floraison</b>								
<b>Teneur en nitrates de l'eau d'irrigation</b>	<b>25</b>		<b>mg / l ou analyses pour les eaux superficielles</b>					
	<b>40</b>		<b>mg / l ou analyses pour les eaux souterraines</b>					
<b>Dose irrigation (mm)</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>240</b>
<b>N apporté 25 mg/l (kg/ha)</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
<b>N apporté 40 mg/l (kg/ha)</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>22</b>

## **Tableau n°8** Coefficients apparent d'utilisation (CAU)

<b>CAU de l'azote par la culture</b>	
<b>Sol bien structuré, bien drainé et culture bien implantée</b>	0,90
<b>Excès d'eau Mauvaise structure du sol Assolement blé/blé Maladies du pied Maladies précoces sur feuillage</b>	0,80
<b>Excès d'eau importants et fréquents (cumul de plusieurs causes précédentes)</b>	0,60



**Tableau n°9**

Valeurs fertilisantes des engrais organiques

Type d'effluents	Valeurs			Type d'effluents	Valeurs		
<b>FUMIERS (T)</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>K</b>	<b>LISIERS (m3)</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>K</b>
Fumiers de bovins mous de logettes	5,1	2,3	6,2	Lisiers de bovins (pur en système couvert)	4	2	5
Fumiers de bovins de litière accumulée	5,8	2,3	9,6	Lisiers de bovins (dilué en système non couvert)	1,6	0,8	2,4
Composts de fumier de bovins	8	5	14	Lisiers de veaux	2	1	2
Fumiers de caprins	6,1	5,2	7	Purins de bovins	0,4	0,2	1,5
Fumiers d'ovins	6,7	4	12	Lisiers de canards	2,5	1,2	1
Fientes sèches de poules pondeuses	30	40	28	Lisiers de canards (fosse couverte)	4,4	1,7	2,5
Fumiers stockés de dindes	21	25	18	Lisiers de porcs à l'engraissement	7,9	7,8	5
Fumiers stockés de pintades	24	23	18	Lisiers de porcs naisseur-engraisseur	4	3,5	2,5
Fumiers autres volailles de chair industrielles	22	22	15	<b>AUTRES EFFLUENTS (m3)</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>K</b>
Fumiers stockés de poulet label	12	10	9	Boues urbaines compostées	8	8	3
Fumiers de canards prêt à gaver	5	4,5	2,2	Boues urbaines pâteuses	10	8	1
Fumiers de porcs	7,2	7	10,2	Boues urbaines liquides	3	2	0,9
Fumiers de lapins	7	7	12	Effluents viticoles	0,1	0,44	0,4
Fumiers frais de chevaux	8,2	3,2	9	Effluents prunicoles	0,02	0,004	0,1

**Tableau n°10**

Coefficients d'équivalence azote (Keq)

Type d'effluents	Keq		Type d'effluents	Keq	
<b>FUMIERS (T)</b>	<b>Apport automne</b>	<b>Apport printemps</b>	<b>LISIERS (m³)</b>	<b>Apport automne</b>	<b>Apport printemps</b>
Fumiers de bovins mous de logettes	0,05	0,26	Lisiers de bovins (pur en système couvert)	0,05	0,46
Fumiers de bovins de litière accumulée	0,1	0,19	Lisiers de bovins (dilué en système non couvert)	0,1	0,1
Composts de fumier de bovins	0	0	Lisiers de veaux	0	0,63
Fumiers de caprins	0,05	0,26	Purins de bovins	0,05	0,53
Fumiers d'ovins	0,05	0,29	Lisiers de canards	0	0,58
Fientes sèches de poules pondeuses	0	0,5	Lisiers de canards (fosse couverte)	0	0,58
Fumiers stockés de dindes	0,05	0,36	Lisiers de porcs à l'engraissement	0,05	0,51
Fumiers stockés de pintades	0,05	0,38	Lisiers de porcs naisseur-engraisseur	0,05	0,55
Fumiers autres volailles de chair industrielles	0,05	0,34	<b>AUTRES EFFLUENTS (m³)</b>	<b>Apport automne</b>	<b>Apport printemps</b>
Fumiers stockés de poulet label	0	0,58	Boues urbaines compostées	0	0,08
Fumiers de canards prêt à gaver	0,05	0,4	Boues urbaines pâteuses	0	0,51
Fumiers de porcs	0,05	0,31	Boues urbaines liquides	0	0,51
Fumiers de lapins	0,05	0,1	Effluents viticoles	0	0
Fumiers frais de chevaux	0,05	0,29	Effluents prunicoles	0	0